

# Deutsch

## Checkliste für Hausärztinnen und Hausärzte

### Vorbemerkungen:

Die Antikörperkombination «Casirivimab / Imdevimab» hat keine Zulassung zur Behandlung von COVID-19-Patientinnen und Patienten. «Casirivimab / Imdevimab» kann zurzeit nur für **bestätigte SARS-CoV-2 Patientinnen und Patienten, die milde bis moderate Symptome aufweisen und ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben**, angewendet werden. **Die einmalige Infusion dauert 30 Minuten mit einer Stunde Nachbeobachtung.**

### Bedingungen für die Behandlung:

- Patientin / Patient erfüllt die Kriterien der Empfehlungen für den Einsatz von monoklonalen Antikörpertherapien durch die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie und Clinical Care Group der Swiss National COVID-19 Science Task Force (**siehe Dokument Kriterienliste**)

### Weitere Bestätigungen:

- Patientin / Patient wurde über die Möglichkeit einer Antikörpertherapie informiert
- Patientin / Patient wurde mit einem zeitnah vereinbarten Termin für die ambulante Therapie an das nächstgelegene Zentrum / Spital des Kantons überwiesen
- Patientin / Patient hat Kontaktnummer des Zentrums erhalten.
- Patientin / Patient wurde über Schutzmassnahmen (Chirurgische Maske, Händedesinfektion, öffentlichen Verkehr vermeiden) auf dem Weg ins Spital informiert

## Français

### Liste de contrôle pour les médecins de famille

#### Remarque préalable :

La combinaison d'anticorps « casirivimab / imdevimab » n'a pas reçu d'autorisation pour le traitement de patients atteints du COVID-19. Pour le moment, « casirivimab / imdevimab » peut uniquement être utilisée chez des patients **qui ont une infection confirmée au SARS-CoV-2 avec des symptômes légers à modérés et qui présentent un risque accru d'évolution sévère. La thérapie consiste en une perfusion unique de 30 minutes, suivie d'une heure en observation.**

#### Conditions pour le traitement :

- Le patient répond aux critères des recommandations pour l'utilisation des thérapies par anticorps monoclonaux par la Société Suisse d'Infectiologie et le groupe de soins cliniques de la Swiss National COVID-19 Science Task Force (**voir document la liste des critères**)

#### Autres confirmations :

- Le patient a été informé de la possibilité d'une thérapie par anticorps monoclonaux
- Le patient a été orienté vers le centre/hôpital le plus proche dans le canton et un rendez-vous a été fixé dans les meilleurs délais
- Le patient dispose du numéro de contact du centre
- Le patient a été informé des mesures de protection en vigueur (masque chirurgical, désinfection des mains, éviter les transports publics) sur le trajet vers le centre/l'hôpital

# Italiano

## Check-list per i medici di famiglia

### Osservazioni preliminari:

La combinazione di anticorpi «Casirivimab/Imdevimab» non ha ancora ottenuto l'approvazione per il trattamento di pazienti COVID-19. Attualmente questa terapia può essere unicamente utilizzata in **pazienti con confermata infezione da SARS-CoV-2 che presentano sintomi da lievi a moderati e sono ad alto rischio per un decorso grave della malattia. La terapia consiste in una singola infusione della durata di 30 minuti, seguita da un'ora di osservazione.**

### Condizioni per il trattamento:

- La/Il paziente soddisfa i criteri delle raccomandazioni per l'uso di terapie con anticorpi monoclonali della Società Svizzera di Malattie Infettive (SSI) e del Gruppo Clinical Care (CCG) della Swiss National COVID-19 Science Task Force (vedi documento Lista dei criteri)

### Ulteriori conferme:

- La/Il paziente è stata/o informata/o della possibilità di una terapia con anticorpi monoclonali.
- La/Il paziente è stata/o indirizzata/o al centro/ospedale cantonale più vicino con un appuntamento immediato.
- Alla/Al paziente è stato messo a disposizione il numero di contatto del centro.
- La/Il paziente è stata/o informata/o sulle misure di protezione (maschera chirurgica, disinfezione delle mani, evitare l'uso dei trasporti pubblici) da impiegare durante il tragitto verso l'ospedale.