

Kategorie	1 Augen		2 Bewegungsapparat				3 Kardiologie		4 Gefässe		5 Chirurgie				6 Gynäkologie		7 Urologie	8 HNO
	Eingriff		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste		Eingriff der BAG-Liste	Eingriff der BAG-Liste
allgemeine Kriterien Version 0.2	1.1 Katarakt	2.1 Handchirurgie	2.2 Fusionsnähle (exkl. Inzision vgl. 2.3 OSME)	2.3 OSME	2.4 Kniearthroskopien inkl. Eingriffe am Meniskus	3.1 PTCA	3.2 Herzschrittmacher inkl. Wechsel	4.1 Verschluss für unteren Extremität	4.2 PTA inkl. Balondilatation	5.1 Hämorrhoiden	5.2 Irgunathemien exkl. brennender Exzision bei Rezidiven	5.3 Umhüllthamie	5.4 Analstiel	5.5 Zirkumzision	6.1 Eingriffe an der Zervix	6.2 Eingriffe am Uterus	7.1 ESWL	8.1 Tonsillorhinotomie und Adenoidektomie
allgemeine Kriterien	allgemeine Kriterien																	
Alter (Geburtsjahr)	unter 16 über 75	n.a.	n.a.		≤ 3 keine obere Alterslimite			≤ 3 keine obere Alterslimite	≤ 3 keine obere Alterslimite	≤ 3 keine obere Alterslimite	≤ 3 keine obere Alterslimite		≤ 3 keine obere Alterslimite	≤ 3 keine obere Alterslimite			≤ 3 keine obere Alterslimite	≤ 3 keine obere Alterslimite
Fehlbildungen	keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen				Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem			Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem		Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem			Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem	Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und/oder Atmungssystem
Kardiale Erkrankungen	Herzinsuffizienz NYHA > II unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch				schwer einstellbare arterielle Hypertonie	EF < 40% und NYHA > II		schwer einstellbare arterielle Hypertonie	schwer einstellbare arterielle Hypertonie	schwer einstellbare arterielle Hypertonie	schwer einstellbare arterielle Hypertonie		schwer einstellbare arterielle Hypertonie	schwer einstellbare arterielle Hypertonie			schwer einstellbare arterielle Hypertonie	schwer einstellbare arterielle Hypertonie
Pulmonale Erkrankungen (nur bei Allgemeinanästhesie)	OSAS mit AHI ≥ 15 und zuhause kein CPAP möglich COPD > GOLD II Asthma instabil oder exazerbiert				Langzeit-Sauerstofftherapie			Langzeit-Sauerstofftherapie	Langzeit-Sauerstofftherapie	Langzeit-Sauerstofftherapie	Langzeit-Sauerstofftherapie		Langzeit-Sauerstofftherapie	Langzeit-Sauerstofftherapie			Langzeit-Sauerstofftherapie	Langzeit-Sauerstofftherapie
Gerinnungsstörungen	keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen				Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen			Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen		Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen			Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen
Blutverdünnung	Duale Tc-Aggregationshemmung	n.a.					Tripaththerapie		Tripaththerapie									
Neurologische Erkrankungen	Demenz MMS ≤ 26, Uhrentest ≤ 5				n.a.			n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	n.a.			n.a.	n.a.
Metabolische Erkrankungen	Diabetes mellitus mit BZ kap. peroperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8% Adipositas BMI ≥ 40 bei Kindern: >97. Perzentil	n.a.	n.a.		Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil	BMI > 35		Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil	BMI > 35				Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil	Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil			BMI < 18.5 oder >30	Diabetes Mellitus schwer einstellbar, instabil
	Mangelernährung/Kachexie (BMI <17.5, bei Kindern <3. Perzentile)				Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch			Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch					Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch	Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch			Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch	Erwachsene: BMI <17.5; bei Kindern: PYMS-Score ≥3 und Definition der Stadien der Mangelernährung bei Kindern gemäss Kodierungshandbuch
	keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen				schwere Stoffwechselstörungen			schwere Stoffwechselstörungen	schwere Stoffwechselstörungen	schwere Stoffwechselstörungen	schwere Stoffwechselstörungen		schwere Stoffwechselstörungen	schwere Stoffwechselstörungen			schwere Stoffwechselstörungen	schwere Stoffwechselstörungen
Niereninsuffizienz	Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min *Eine dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz Stadium 5 begründet für sich keinen stationären Aufenthalt				CKD > 3	< 60 ml/min*	< 60 ml/min*	CKD > 3	< 60 ml/min*	CKD > 3	CKD > 3		CKD > 3	CKD > 3			CKD > 3	CKD > 3
Kontrastmittel-Allergie	Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium				n.a.			n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	n.a.			n.a.	n.a.
Psychisch	keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen				Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen			Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen		Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen			Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen	Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen
	Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapie bei einer ambulanten Nachsorge unmöglich machen																	
Soziale Faktoren	Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ. Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi. Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h Notfall und entsprechender Disziplin.					Kontaktperson im selben Haushalt	Kontaktperson im selben Haushalt		Kontaktperson im selben Haushalt									
	keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen				Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung			Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung		Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung			Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung	Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung
	keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen				relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten			relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten	relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten	relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten	relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten		relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten	relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten			relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten	relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin/dem Patienten
Eingriffsspezifische Kriterien		Drainage mit relevanter Fördermenge.	Drainage mit relevanter Fördermenge.	Drainage mit relevanter Fördermenge.		Drainage mit relevanter Fördermenge.		Drainage mit relevanter Fördermenge.	Beidseitige Intervention mit beidseitiger Punktion.			Laparoskopische Operationen	Verschluss durch Lappen oder Implantat				Infektsteine (Stein bei obstruierender Pyelonephritis oder bei rezidivierenden positiven Urinkult mit gleichem Keim).	
		Gestielte Lappenplastiken.	Gestielte Lappenplastiken.	OSME im Bereich Scapula, Rippen, Sternum.				Aortenaneurysmen und Eingriffe an viszeralem Gefässen.				Implantation von Membran/Netz	M. Crohn					
		OSME kombiniert an Radius und Ulna oder im proximalen Drittel des Arms.	OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen).	OSME kombiniert an Radius und Ulna oder im proximalen Drittel des Arms.				St.n. Leistenring bei Panktion in der Leiste.										
		Rezidiv-CTS.	OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen) oder nach grossen Weichteilrekonstruktionen.	OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen) oder nach grossen Weichteilrekonstruktionen.				Zugang mittels Schleuse >6F.										
		M. Dupuytren betreffend: > 2 Strahlen	> 3 Hammerzeheknorrekturen auf 1 Seite in 1 Sitzung.					Verschlussrekannulation.										
		> 2 Gelenke	Diabetischer Fuss mit Polyneuropathie.					Endovaskuläre Fremdkörperentfernung.										
		Lappenplastik > 10cm ²																
		Rezidiv-Operationen			OSME von Marknägel (nicht Spickdrähtel)													

Legende
nicht anwendbar, d.h. das generelle Kriterium gilt nicht und es wurde kein alternatives Kriterium definiert.
n.a. Bsp. Alter = n.a. bedeutet, dass das Alter bei der Beurteilung, ob eine Eingriff ambulant oder stationär erfolgen soll, keine Anwendung findet.