

## Merkblatt empfohlene Mindestmengen Schutzmaterial

Die Umsetzung der unten aufgeführten Empfehlungen obliegt der Eigenverantwortung der jeweiligen Institution.

1) Empfohlene Anwendung der Schutzmasken gemäss BAG (vgl. Tab. II.10.2. IPP-CH, Teil II, Kap. 10, S. 60):

Personengruppen	Phase, Verwendungszweck	
	Kontaktmanagement, Eindämmung	Abschwächung
Direkt exponiertes medizinisches Spitalpersonal	FFP2/3 <sup>a</sup> / Hygienemaske	FFP2/3 <sup>a</sup> / Hygienemaske
Ambulantes Gesundheitspersonal <sup>b</sup>	FFP2/3 <sup>a</sup> / Hygienemaske	FFP2/3 <sup>a</sup> / Hygienemaske
Erkrankte Personen zu Hause und ihre Kontaktpersonen	Hygienemaske <sup>c</sup>	Hygienemaske
Gesunde Bevölkerung	-	Hygienemaske <sup>d</sup>

<sup>a</sup> Das Gesundheitspersonal soll, soweit verfügbar, während der ganzen Pandemie in allen Situationen mit hoher Infektionsgefahr FFP2/3 Masken tragen (z. B. während Aerosol generierender Arbeiten, Intubation, bei engem Kontakt mit Verdachtsfällen [Transport, Pflege, klinische Untersuchung, usw.]).

<sup>b</sup> Inklusiv Apotheken- und Pflegepersonal soziomedizinischer Zentren und Einrichtungen (Alters- und Pflegeheime, Spitex usw.)

<sup>c</sup> Gilt für Kontaktpersonen, sofern die Erkrankten nicht ohnehin in dieser Phase hospitalisiert/isoliert sind.

<sup>d</sup> Das Tragen einer Hygienemaske ist nicht generell nötig, sondern nur in bestimmten, vom BAG empfohlenen Situationen.

2) Empfehlungen zur Lagerhaltung an Hygienemasken (vgl. Tab. II 10.1, IPP-CH, Teil II, Kap. 10, S.60):

Bereich		Empfehlung
Stationärer Bereich	Spitäler	Annahme: Der Normalverbrauch ist im Pandemiefall um 35 % reduziert <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerreichweite von 4 ½ Monaten Normalverbrauch</b> an Hygienemasken*</li> </ul>
	Alters- und Pflegeheime, soziomedizinische Institutionen, Institutionen für Kinder	Annahme: 1-Bett-Zimmer, Krankheitsdauer 7 Tage für Erwachsene und 21 Tage für Kinder (0-14 Jahre) <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerreichweite von 3 Monaten Normalverbrauch</b> an Hygienemasken*</li> <li>Zusätzlich: <b>Lagerhaltung von 14 Hygienemasken* pro Bett für Erwachsene und 84 Hygienemasken* pro Bett für Kinder</b> (0-14 Jahre)</li> </ul>
Ambulanter Bereich	Arztpraxen	Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Patientenkontakt, 7 Tage/Woche <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Patientenkontakt</b></li> </ul>
	Apotheke	Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 4 Masken/Tag/Person mit Kundenkontakt, 7 Tage/Woche <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerhaltung von 336 Hygienemasken* pro Person** mit Kundenkontakt</b></li> </ul>
	Rettungsdienste	Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen; ¼ der Fahrten betreffen Grippe-Erkrankte <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerreichweite von 4 Monaten Normalverbrauch</b>, wovon 3 Monate zur Deckung des Normalverbrauchs und 1 Monat für die zusätzlich zu transportierenden Grippe-Erkrankten</li> </ul>
	Spitex	Annahme: Pandemiedauer: 12 Wochen; Krankheitsdauer 7 Tage, 4 Masken/Tag/Vollzeitstelle mit Patientenkontakt, 7 Tage/Woche <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lagerreichweite von 125*** Hygienemasken* pro Person mit Klienten- bzw. Patientenkontakt.</b> Bei häufigerem Wechsel der Maske ist mit einem höheren Bedarf an Masken zu rechnen</li> </ul>
Übrige	Schweizer Bevölkerung	<b>50 Hygienemasken pro Person</b> als persönlicher Notvorrat <sup>26</sup>

\* bzw. FFP2/3 Masken, je nach Ermessen der betroffenen Institution

\*\* Vollzeitstelle

\*\*\* Anzahl Kontakte/Vollzeitstellen

3) Empfehlungen zur Lagerhaltung an Untersuchungshandschuhen (vgl. Tab. II 10.5, IPP-CH, Teil II, Kap.10, S. 62)

Bereich		Empfehlung*
Stationärer Bereich	Spitäler	<b>Lagerreichweite von 3 Monaten Normalverbrauch</b>
	Alters- und Pflegeheime, soziomedizinische Institutionen, Internate	Annahme: 1-Bett-Zimmer, Krankheitsdauer 7 Tage <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lagerreichweite von 3 Monaten Normalverbrauch</b></li> <li>• Zusätzlich: <b>28 Untersuchungshandschuhe pro Bett für Erwachsene und 168 pro Bett für Kinder (0-14 Jahre)</b></li> </ul>
Ambulanter Bereich	Arztpraxen	Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, 15 Kontakte à 2 Untersuchungshandschuhe/Tag/Person** mit Patientenkontakt <b>2500 Untersuchungshandschuhe pro Person** mit Patientenkontakt</b>
	Apotheken	Keine Empfehlungen zur Lagerhaltung. Händehygiene und generell Verhaltensmassnahmen propagieren
	Rettungsdienste	Annahme: Pandemiedauer 12 Wochen, ¼ der Fahrten betreffen Grippe-Erkrankte <b>Lagerreichweite von 4 Monaten Normalverbrauch</b> , wovon 3 Monate zur Deckung des Normalverbrauchs und 1 Monat für die zusätzlich zu transportierenden Grippe-Erkrankten
	Spitex	<b>Lagerreichweite von 3 Monaten Normalverbrauch</b>
Übrige	Schweizer Bevölkerung	Keine Empfehlung zur Lagerhaltung. Händehygiene und generell Verhaltensmassnahmen propagieren.

\* All diese Empfehlungen schliessen die Einhaltung flankierender Massnahmen in allen Bereichen mit ein.

\*\* Vollzeitstelle