

## Bronchiolitis durch RSV

# Schützen Sie Ihr Kind

RSV-Bronchiolitis ist eine Entzündung der Bronchien, die durch das Atemwegsvirus RSV verursacht wird. RSV zirkuliert jedes Jahr zwischen Oktober und März. Es betrifft hauptsächlich Kinder unter 12 Monaten. Insbesondere bei Säuglingen unter 3 Monaten besteht ein höheres Risiko für Komplikationen und Spitalaufenthalte. Seit Herbst 2024 gibt es erstmals eine äusserst wirksame Behandlung zur Vorbeugung. Diese wird vom Berner Gesundheitsamt empfohlen.

### Impfkampagne gegen Bronchiolitis durch RSV

Optimaler Zeitpunkt der Impfung:

- **Neugeborene (geboren von Oktober bis März):** kurz nach der Geburt
- **Säuglinge (geboren von April bis September):** im Oktober
- **Besonders gefährdete Kinder unter 2 Jahren:** im Oktober

Die Immunisierung erfolgt in Form einer intramuskulären Injektion eines neuen Antikörpers, Nirsevimab (Beyfortus®).

Mehr Informationen [www.be.ch/rsv](http://www.be.ch/rsv)



Kanton Bern  
Canton de Berne