

Bronchiolitis durch RSV

Vorbeugende Massnahmen gegen Bronchiolitis durch RSV




IMMUNISIERUNG AB
OKTOBER IN DER
GEBURTSKLINIK ODER
KINDERARZTPRAXIS




SÄUGLINGE < 3
MONATEN: BESUCHE
BESCHRÄNKEN AUF
GESUNDE
FAMILIENMITGLIEDER



HÄNDEHYGIENE VOR
UND NACH KONTAKT MIT
SÄUGLING



ABSTAND HALTEN BEI
AKUTER ERKRANKUNG



TRAGEN EINER MASKE
BEI SYMPTOMEN EINER
ATEMWEGSINFektion



MEIDEN VON
MENSCHENANSAM-
MLUNGEN UND
ÜBERFÜLLTEN ORTEN

So erkennen Sie eine Bronchiolitis:

Atembeschwerden oder pfeifende Atmung im Zusammenhang mit Husten, Fieber und/oder verstopfter Nase

Bei Symptomen:

- Wenden Sie sich vorrangig an Ihre Kinderarztpraxis
- Oder rufen Sie Medphone 0900 57 67 47 (CHF 3.23/min, Warteschleife ohne Zusatzkosten) oder die 144 (bei dringenden Notfällen) an

Wenn Sie folgende Symptome bemerken:

- deutliche Verhaltensänderung,
- schlaffes Kind,
- sehr schnelle oder langsame Atmung,
- bläuliche Verfärbung der Lippen oder Extremitäten,

➡ Gehen Sie zur nächsten Notaufnahme

Mehr Informationen



www.be.ch/rsv



Kanton Bern
Canton de Berne