

Bronchiolitis durch RSV

Vorbeugende Massnahmen gegen Bronchiolitis durch RSV




IMMUNISIERUNG AB
OKTOBER IN DER
GEBURTSKLINIK
ODER
KINDERARZTPRAXIS




SÄUGLINGE < 3 MONATE:
BESUCHE BESCHRÄNKEN
AUF GESUNDE
FAMILIENMITGLIEDER



HÄNDEHYGIENE VOR
UND NACH KONTAKT MIT
DEM SÄUGLING



ABSTAND HALTEN BEI AKUTER
ERKRANKUNG



TRAGEN EINER MASKE
BEI SYMPTOMEN
EINER ATEMWEGS-
INFEKTION



MEIDEN VON
MENSCHENANSAMM-
LUNGEN UND
ÜBERFÜLLTEN
ORTEN

So erkennen Sie eine Bronchiolitis:

Atembeschwerden oder pfeifende Atmung im Zusammenhang mit Husten, Fieber und/oder verstopfter Nase

Bei Symptomen:

- Wenden Sie sich vorrangig an Ihre Kinderarztpraxis
- Oder rufen Sie Medphone 0900 57 67 47 (CHF 3.23/min, Warteschleife ohne Zusatzkosten) oder die 144 (bei dringenden Notfällen) an

Wenn Sie die folgenden Symptome bemerken: deutliche Verhaltensänderung, schlafes Kind, sehr schnelle oder sehr langsame oder unregelmäßige Atmung, bläuliche Verfärbung der Lippen oder Extremitäten, gehen Sie zur nächsten Notaufnahme.

Mehr Informationen



www.be.ch/rsv



Kanton Bern
Canton de Berne