


Traduction turque du formulaire "Poux de t te   l' cole" / Edition 2021

Bro ur: „ ocuđunuzun sınıfında ba  biti mi var!“

En  nemli Bilgiler Kısaca:

- Ba  biti herkese bula abilir – Ondan yine birlikte kurtulacađız.
-  abuk harekete ge mek okuldaki bula ma  emberini kırar.
- **Ba  bitinin te hisi ve tedavisi/m dahalesi ana-babanın meselesidir.**
 -  ocuđunuzu ve diđer aile bireylerini l tfen hemen bug n kontrol edin (a ađıya bakın).
 - Ba  biti bulduđunuz takdirde, buna derhal arka sayfadaki talimata g re tedavi edin.
- Ba ında canlı bit olan  ocuklar, okula ancak bit ilacıyla yapılan ilk tedaviden sonra gidebilirler.

Ba  Bitinin G r n   ve Ya ama S resi



- **Yumurtalar** („bit sirkesi“, bo  olduklarında) sa lara sıkıca yapı ırlar. Onlar kepek gibi g r n r ama hen z atılamazlar.
- Ba  bitleri sa ın rengine benzer renktedir ve ı ıktan ka arlar. G zle bakarak yapılan kuru sa  kontrol nde g zden ka abilirler. (Islak sa  kontrol  i in a ađıya bakın)

Ba  Biti, Yumurtası ve Bit Sirkesi Bulmak İ in Dođru Yol (Tarama kontrol )

1. Sa ları ıslatın.
2. Sa  bakım kremi (Pflegesp lung; buna "Conditioner" de denir) ıslak sa a iyice yayın.
3. Dađılmı  sa ları iyice tarayın (fır a/tarak).
4. Sa ları par a par a ayırarak  bekler halinde sa  dibinden u larına kadar bit tarađı ile tarayın.



Resim: Islak sa ın bit tarađı ile sa  k k nden u larına kadar taranması

5. Her taramadan sonra yumurtaları g rmek i in, bit tarađını beyaz bir k đıda (mesela k đıt havlu) silkeleyin.
6. Sa ları iyice durulayın.

Bulguya g re Tarama ve Tedavi Őeması

Ana Kural: **4 hafta içinde 7 defa taramaktır!** Bit ilacı ancak canlı bit bulunması halinde kullanılır.

Özellikle etkili bit ilaçları Hedrin ve Paranix "Spray" tir. Bit ilaçları ve bit tarakları eczanelerde ve drogerilerde temin edilebilir. Hamilelikte, emziren bayanlarda ve küçük çocuklarda kullanma kılavuzuna dikkat edilmelidir.

Daha fazla bilgi almak için internette www.gef.be.ch ve www.lausinfo.ch adreslerine başvurulabilir.

Tarama ve Tedavi Şeması

1. Gün	Tespit: Tarakla (sayfa 1'e bakın) A: Eğer baş biti mevcutsa, bit ilacıyla (mesela Hedrin ve Paranix "Spray" tedavi edin ve tarayarak atın. B) Eğer sadece yumurtalar/bit sirkesi mevcutsa bit ilacı kullanmadan tarayarak atın. C: Eğer ne bit ne de bit sirkesi yoksa, acil bir tedbire lüzum yoktur. (Fakat 7 gün sonra tarama kontrolü yapılmalıdır!)
3. Gün	A+B: Arta kalan baş bitlerini ve veya bit yumurtalarını/sirkelerini tarayarak atın (Tarama kontrolü)
7. Gün	A: İkinci bit ilacı tedavisi ve bitlerin ve veya yumurtaların/bit sirkelerinin tarama yoluyla atılması B: Daha kalmış bulunan (veya yeni) yumurta/bit sirkelerinin tarama yoluyla atılması C: Tarama kontrolü
10. Gün	A+B: Tarama kontrolü
14. Gün	- Şayet halâ (veya yeni) baş biti bulunursa, ilaçlı tedavi uygulamasına A şemasına göre ilaçla birinci günden başlayın ve tarayarak atın. - Eğer ne baş biti ne de yumurta/bit sirkesi kalmamışsa, tedavi bitmiştir.
21. Gün 28. Gün	Olası bir yeni bulaşmaya karşı, iki hafta daha haftada bir gün tarama kontrolü yapılmalıdır.

Şayet iki haftalık Hedrin tedavisi sonrasında halâ canlı bit bulunursa, aşağıda belirtilen uzman kişiye başvurun! Bu uzman size memnuniyetle danışmanlık edecektir.

Önemli

- Bir bit bulaşması durumunda, yayılmasını önlemek için derhal en yakın çevrenizi bu durumdan haberdar edin: Okul, anaokulu, arkadaşlar vs.
- Haftada bir defa bir bit tarağı ile **bütün aile bireylerinin** bit kontrolünü yapın!
- Tarak, fırça, saç tokalarını 60 derece sıcak sabunlu su içinde 10 dakika bekletin!
- Uzun saçları bağlayın (saçların başka saçlarla doğrudan temasından kaçınınız!)
- Başka önlemler gerekli değildir, başa konsantre olun!
- En iyi önlem: Erken teşhis için kontrol maksadıyla çocukların başlarında ıslak saçlara haftada bir kez bakım kremi (Pflegespülung; buna "Conditioner" de denir) sürüp bit tarağı ile taramak.

Sorularınız için hizmetinizdedir: