



Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

Campagne de vaccination contre le COVID-19

Berne, le 8 décembre 2023

## Infolettre 18 destinée aux lieux de vaccination

Mesdames, Messieurs,

Destinée à tous les fournisseurs de prestations, la présente infolettre contient des informations sur le déroulement des vaccinations contre le COVID-19 à l'hiver 2023-2024.

### Livraison du vaccin et du matériel, dès la semaine 50 (11.12-15.12) et pendant les fêtes

Depuis le mois d'octobre, les vaccins sont livrés **deux fois** par semaine. Dès la semaine prochaine (semaine 50, 11-15.12 2023), **les livraisons se feront les jeudis et mardis** à la place des mercredis et vendredis.

- Les commandes réalisées jusqu'au mardi midi seront livrées à partir du jeudi de la même semaine (dans un délai de 2 à 4 jours ouvrés).
- Les commandes réalisées jusqu'au vendredi midi seront livrées à partir du mardi de la semaine suivante (dans un délai de 2 à 4 jours ouvrés).

**Entre Noël et Nouvel-an ainsi que la première semaine de l'année 2024 aucune livraison de vaccins et d'accessoires ne sera effectuée.**

- La dernière livraison possible pour l'année 2023 aura lieu le jeudi 21 décembre 2023 et la commande devra être effectuée au plus tard jusqu'au mardi 19 décembre 2023 midi.
- La première livraison possible pour l'année 2024 aura lieu le jeudi 11 janvier 2024 et comprendra toutes les commandes effectuées jusqu'au mardi 9 janvier 2024 midi.

### Recommandation de vaccination pour les enfants de 6 mois à 4 ans qui présentent une immunodéficiência sévère

Étant donné que les enfants de 6 mois à 4 ans qui ne présentent pas d'immunodéficiência sévère n'ont qu'un faible risque de développer une forme grave du COVID-19, la vaccination contre cette maladie ne leur est pas recommandée

La vaccination avec Comirnaty® 3 µg (souche originale du SARS-CoV-2, vaccin pédiatrique) est recommandée uniquement pour les enfants de 6 mois à 4 ans qui présentent une immunodéficiência sévère. Le schéma de vaccination recommandé comprend trois doses, avec des intervalles minimaux de quatre semaines entre la première et la deuxième puis de huit semaines entre la deuxième et la troisième. Cette recommandation s'applique indépendamment du nombre d'infections au SARS-CoV-2 déjà contractées. La vaccination doit être effectuée au plus tôt six mois après la dernière infection connue au SARS-CoV-2.

### Autres questions

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le processus de vaccination, de l'enregistrement à l'administration des doses, sur la page :

### **Informations sur la vaccination à l'intention des professionnels de la santé**

Les points de contact habituels restent à votre disposition :

- En cas de question sur VacMe, pour communiquer des informations destinées à la page recensant les lieux de vaccination : [dispo.vac@be.ch](mailto:dispo.vac@be.ch), 031 636 98 27
- En cas de besoin d'assistance pour le service de commande en ligne : [pharm.vac@be.ch](mailto:pharm.vac@be.ch)

- En cas de questions médicales, veuillez vous référer au site de l'OFSP : [COVID-19 : vaccination \(admin.ch\)](https://www.ofsp.admin.ch)

En vous remerciant vivement de votre engagement, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.



Barbara Grützmacher  
Médecin cantonale  
Pour le Service du médecin cantonal

Ambroise Ecoffey  
Gestion des partenaires  
Office de la santé

Annexes :

- Informations sur la vaccination contre le COVID-19 du 27 novembre 2023