



Administration du vaccin Nuvaxovid[®] : liste de contrôle (vaccin à protéine de Novavax contre le COVID-19)

✓ Spécifiquement avant la 1^{re} vaccination

Clarification administrative	<ul style="list-style-type: none"> Clarifier la forme d'assurance de la personne à vacciner (AOS/carte d'assuré) Vérifier l'identité de la personne à vacciner
Clarification de l'indication à la vaccination	<ul style="list-style-type: none"> La stratégie suisse de vaccination contre le COVID-19 se base principalement sur les vaccins à ARNm La vaccination avec le Nuvaxovid[®] est recommandée pour les personnes de plus de 18 ans, hormis les femmes enceintes ou allaitantes, qui ne peuvent pas se faire vacciner avec un vaccin à ARNm pour des raisons médicales ou qui refusent les vaccins à ARNm. <ul style="list-style-type: none"> Contre-indications pour les vaccins à ARNm : <ul style="list-style-type: none"> Antécédents d'anaphylaxie ou allergies sévères aiguës aux composants du vaccin Hypersensibilité connue ou probable à l'un des composants du vaccin (en particulier polyéthylène glycol [PEG], macroglycol, trométhamine (trométamol, [TRIS])) Réaction anaphylactique après la première dose d'un vaccin ARNm → Investigation et consultation auprès d'un spécialiste en allergologie et immunologie clinique Sur la base des Recommandations de vaccination actuelles de la CFV / de l'OFSP www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante
Clarification des contre-indications	<ul style="list-style-type: none"> Hypersensibilité connue à l'un des composants du vaccin (par ex. polysorbate 80, saponines, Matrix-M[™])
Vaccination actuellement non recommandée	<ol style="list-style-type: none"> Enfants et adolescents (<18 ans) Femmes enceintes ou en période d'allaitement
Clarification des précautions spéciales	<ol style="list-style-type: none"> De manière générale, réactions d'hypersensibilité/allergies connues ? Immunosuppression (congénitale, acquise, traitement immuno-suppresseur y. c. cancer sous traitement) <ul style="list-style-type: none"> → Indication de vaccination peu restrictive après examen soigneux des bénéfices et des risques par le médecin spécialisé et après information appropriée <p>En principe, la vaccination avec un vaccin à ARNm est recommandée pour les personnes immunodéficientes. Le Nuvaxovid[®] ne doit être administré qu'après une évaluation individuelle des bénéfices-risques (efficacité, tolérance) réalisée par le médecin spécialiste traitant, notamment en comparaison avec la vaccination à ARNm. (Recommandations de vaccination, et sur www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante)</p>

✓ Avant la 2^e vaccination

Effets indésirables des vaccinations (EIV) après la première dose ?	<ul style="list-style-type: none"> Les noter dans l'outil informatique prévu à cet effet Les EIV inattendus ou sévères doivent être signalés à Swissmedic par les professionnels de la santé qui les diagnostiquent. En cas de réaction anaphylactique après la première dose, la deuxième dose avec le même vaccin est provisoirement contre-indiquée et nécessite d'abord une investigation et une confirmation par un spécialiste en allergologie et immunologie clinique. Pour plus de précision voir les explications correspondantes dans les Recommandations de vaccination.
Signalement d'EIV à Swissmedic	<ul style="list-style-type: none"> Lien vers le système électronique Vigilance « EIViS » dans l'outil informatique : www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/elvis.html
Clarification de l'indication pour la 2^e dose de vaccin / anamnèse COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> L'administration de la 2^e dose de vaccin est recommandée quatre semaines après celle de la 1^{re} dose de vaccin Infection confirmée au SARS-Cov-2: <ol style="list-style-type: none"> Preuves si avant la 1^{re} dose : test PCR/antigénique/IgG anti-spike ou anti-nucléocapside ; les autotests ne sont pas valables Preuves si après la 1^{re} dose : test PCR/antigénique/IgG anti-nucléocapside ; les autotests ne sont pas valables → Vaccination avec une seule dose recommandée si au moins quatre semaines se sont écoulées entre l'administration de la 1^{re} dose et l'infection confirmée. <ul style="list-style-type: none"> Exception : IgG anti-nucléocapside après 1^{re} vaccination : aucun intervalle minimal requis. Résultats positifs des différents tests SARS-CoV-2/COVID-19 : interprétation et conséquences et www.bag.admin.ch/covid-19-documents-professionnels-de-la-sante - Les tests COVID-19



✓ Administration de la 1^{re} vaccination / 2^e vaccination

État de santé actuel	<ul style="list-style-type: none"> Clarifier l'état de santé général et décider : la vaccination peut-elle être réalisée aujourd'hui ? Affection fébrile aiguë ? Repousser la vaccination jusqu'à disparition des symptômes.
Information de la personne	<ul style="list-style-type: none"> La personne à vacciner a-t-elle des questions ? A-t-elle lu le matériel d'information (p. ex. fiche d'information de l'OFSP) ? Rendre attentif à d'éventuels EIV, en particulier aux réactions allergiques.
Consentement de la personne	<ul style="list-style-type: none"> Après lui avoir fourni toutes les informations, obtenir le consentement oral de la personne pour la vaccination et pour l'enregistrement électronique de celle-ci dans le système de saisie. Inscrire le consentement à la vaccination dans la fiche de vaccination/l'outil informatique. En cas d'incapacité de discernement, le consentement du représentant légal est nécessaire.
Remplissage de la fiche de vaccination/ saisie dans l'outil informatique	<ul style="list-style-type: none"> Saisir les données de la personne à vacciner dans l'outil informatique.
Préparation du vaccin	<ul style="list-style-type: none"> Voir la notice du fabricant : www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.novavaxcovidvaccine.com Ne pas agiter, seulement retourner plusieurs fois. Manipuler avec précaution. Si possible, le bouchon ne devrait être percé qu'une seule fois avec l'aiguille et le mouvement de l'aiguille dans le bouchon doit être minimisé.
Application du vaccin	<ul style="list-style-type: none"> Voir la notice du fabricant : www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.novavaxcovidvaccine.com Intramusculaire, dans le deltoïde (musculus deltoideus) Il est recommandé d'administrer les deux doses de vaccin à 4 semaines d'intervalle. Exceptions, voir : « Clarification de l'indication pour la 2^e dose de vaccin ». Pour les personnes sous anticoagulant : la vaccination est également administrée par voie intramusculaire. Il est important d'assurer ensuite une bonne compression. (www.bag.admin.ch/plandevaccination)

✓ Après toutes les doses de vaccination

Comportement en cas d'EIV	<ul style="list-style-type: none"> Signaler que les EIV sévères ou inhabituels doivent être déclarés et que la personne vaccinée doit contacter le/la médecin, le/la pharmacien/ne ou le centre de vaccination. Donner le numéro à contacter le cas échéant
Informations générales à communiquer après la vaccination	<ul style="list-style-type: none"> La protection vaccinale est attendue 1-2 semaines après la 2^e injection. Continuer à respecter les recommandations en matière d'hygiène et de conduite. En cas de symptômes compatibles avec le COVID-19, effectuer un test (le vaccin n'est pas efficace à 100 %) Aucun intervalle minimal avec d'autres vaccins n'est nécessaire.
Remise du certificat de vaccination	<ul style="list-style-type: none"> Fournir le certificat de vaccination à partir de l'outil informatique ou faire l'inscription dans le carnet de vaccination Tampon et signature de la personne qui administre le vaccin si possible Coller ou inscrire le numéro du lot dans le certificat de vaccination Informé sur le certificat COVID et le délivrer sur demande : www.bag.admin.ch/certificat-covid
Prochain rendez-vous (si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none"> Fixer le rendez-vous au même lieu de vaccination, et l'inscrire dans l'outil informatique Si besoin, donner une carte de rendez-vous Distribuer un aide-mémoire contenant des informations sur ce qu'il faut faire après la vaccination
Période d'observation après la vaccination	<ul style="list-style-type: none"> Du personnel formé et un kit d'urgence (avec adrénaline) doivent être à disposition en cas de réaction allergique. Surveiller en particulier les personnes qui ont déjà eu des problèmes directement après la vaccination, par exemple des problèmes cardio-vasculaires. Toutes les personnes doivent rester sur place au moins 15 minutes après la première dose de vaccin. Si celle-ci est bien tolérée, une surveillance de 5 minutes après la deuxième dose est suffisante.

