

Bronchiolite due au VRS

Mesures de prévention contre la bronchiolite due au VRS




IMMUNISATION À LA
MATERNITÉ OU CHEZ LE
PÉDIATRE DÈS OCTOBRE




BÉBÉ MOINS DE 3 MOIS :
VISITES LIMITÉES À LA
FAMILLE EN BONNE SANTÉ



HYGIÈNE DES MAINS
AVANT ET APRÈS
MANIPULATION DU BÉBÉ



DISTANCIATION PHYSIQUE DE
LA FRATRIE SI SYMPTÔMES
LORS DE LA PHASE AIGUE DE
L'INFECTION



PORT DU MASQUE EN
CAS DE SYMPTÔMES
D'INFECTION
RESPIRATOIRE



ÉVITER LES
REGROUPEMENTS
ET LES LIEUX TRÈS
FRÉQUENTÉS

Sachez reconnaître la bronchiolite :

Gêne ou sifflement respiratoire dans un contexte de toux, fièvre ou obstruction du nez

En cas de symptômes :

- Contacter en priorité le pédiatre de l'enfant
- À défaut, appeler le Centre d'appels pour les urgences médicales (MEDPHONE) au 0900 57 67 47 (CHF 3.23/min.) ou les Urgences vitales au 144

Si vous constatez les symptômes suivants : modification significative du comportement, enfant mou, respiration très rapide ou très lente ou irrégulière, coloration bleutée des lèvres ou des extrémités, dirigez-vous vers les urgences les plus proches.

Plus d'info sur



www.be.ch/vrs



Kanton Bern
Canton de Berne