

## Notice Recommandation relatives à la réserve minimum d'équipements de protection

La mise en œuvre des recommandations énumérées ci-dessous relève de la responsabilité individuelle des institutions.

- 1) Recommandations de l'OFSP relatives au port de masques de protection (voir tableau II.10.2. PPI-CH, Partie II, chap. 10, p. 60) :

Groupe de personnes	Phase, objectif	
	Gestion des contacts, endiguement	Atténuation
Personnel médical hospitalier directement exposé	FFP2/3 <sup>a</sup> / masque d'hygiène	FFP2/3 <sup>a</sup> / masque d'hygiène
Personnel médical ambulatoire <sup>b</sup>	FFP2/3 <sup>a</sup> / masque d'hygiène	FFP2/3 <sup>a</sup> / masque d'hygiène
Malades à domicile et personnes contacts	Masque d'hygiène <sup>c</sup>	Masque d'hygiène
Population en bonne santé	-	Masque d'hygiène <sup>d</sup>

<sup>a</sup> Pour autant qu'ils soient disponibles, les masques FFP2/3 doivent être portés par le personnel médical dans toutes les situations à haut risque durant toute la pandémie (par ex. durant des activités produisant des aérosols, l'intubation, lors de contact étroit avec des cas suspects (transport, soins, examens cliniques, etc.).

<sup>b</sup> Y compris les pharmacies et le personnel de soins des centres et établissements médico-sociaux (homes pour personnes âgées, centres de soins, soins à domicile, etc.).

<sup>c</sup> Valable pour les personnes contacts pour autant que les malades ne soient pas d'emblée hospitalisés / isolés dans cette phase.

<sup>d</sup> Le port d'un masque d'hygiène n'est pas systématiquement nécessaire, mais seulement dans les situations recommandées par l'OFSP.

- 2) Recommandations relatives au stockage des masques de protection (voir tableau II 10.1, PPI-CH, Partie II, chap. 10, p. 60) :

Domaine		Recommandation
Domaine résidentiel	Hôpitaux	Hypothèse : consommation normale diminuée de 35% en cas de pandémie <ul style="list-style-type: none"> <li><b>couverture du stock : 4½ mois de consommation normale</b> pour les masques d'hygiène*</li> </ul>
	Homes pour personnes âgées, instituts médico-sociaux, établissements pour enfants	Hypothèse : chambres à 1 lit, maladie durant 7 jours chez les adultes et 21 jours chez les enfants (0-14 ans) <ul style="list-style-type: none"> <li><b>couverture du stock : 3 mois de consommation normale</b> pour les masques d'hygiène*,</li> <li><b>en plus : réserve de 14 masques d'hygiène* par lit</b> pour les adultes et de 84 masques par lit pour les enfants (0-14 ans)</li> </ul>
Domaine ambulatoire	Cabinets médicaux	Hypothèse : pandémie durant 12 semaines, 4 masques / jour / personne en contact avec les patients, 7 jours/semaine <ul style="list-style-type: none"> <li><b>réserve de 336 masques d'hygiène* par personne** en contact avec les patients</b></li> </ul>
	Pharmacies	Hypothèse : pandémie durant 12 semaines, 4 masques/jour/personne en contact avec les clients, 7 jours/semaine <ul style="list-style-type: none"> <li><b>réserve de 336 masques d'hygiène* par personne** en contact avec les clients</b></li> </ul>
	Services de Sauvetage	Hypothèse : pandémie durant 12 semaines, ¼ des trajets concernant des malades de la grippe <ul style="list-style-type: none"> <li><b>couverture du stock : 4 mois d'usage normal</b>, dont 3 mois pour couvrir l'usage normal et 1 mois pour les transports supplémentaires concernant des malades de la grippe</li> </ul>
	Services d'aide et de soins à domicile	Hypothèse : pandémie durant 12 semaines, maladie durant 7 jours, 4 masques/jour/poste à temps plein en contact avec les patients, 7 jours/semaine <ul style="list-style-type: none"> <li><b>réserve de 125*** masques d'hygiène* par personne** en contact avec les clients/patients. Compter des besoins plus importants si changement de masques plus fréquent</b></li> </ul>
Autres	Population suisse	<b>50 masques d'hygiène par personne</b> comme provisions domestiques d'urgence <sup>26</sup>

\* Ou masques FFP2/3, selon l'évaluation des institutions concernées

\*\* Poste à temps plein

\*\*\* Nombre de contacts / postes à temps plein

3) Recommandations relatives au stockage des gants chirurgicaux (voir tableau II 10.5, PPI-CH, Partie II, chap. 10, p. 62)

Domaine		Recommandation*
Domaine résidentiel	Hôpitaux	<b>Couverture du stock : 3 mois de consommation normale</b>
	Homes pour personnes âgées, instituts médico-sociaux, internats	Hypothèse : Chambre à un lit, maladie durant 7 jours <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>couverture du stock : 3 mois de consommation normale</b></li> <li>• en plus : <b>28 gants chirurgicaux par lit pour les adultes et 168 gants par lit pour les enfants (0-14 ans)</b></li> </ul>
Domaine ambulatoire	Cabinets médicaux	Hypothèse : pandémie durant 12 semaines, 15 contacts à 2 gants/jour/personne** en contact avec les patients <b>2500 gants chirurgicaux par personne** en contact avec les patients</b>
	Pharmacies	Pas de recommandation relative à la constitution de stocks. Généraliser l'hygiène des mains et, de manière générale, les mesures comportementales
	Services de sauvetage	Hypothèse : pandémie durant 12 semaines, ¼ des trajets concernant des malades de la grippe <b>Couverture du stock : 4 mois de consommation normale</b> , dont 3 mois pour couvrir la consommation normale et 1 mois pour les trajets supplémentaires concernant des malades de la grippe
	Aide et soins à domicile	<b>Couverture du stock : 3 mois de consommation normale</b>
Autres	Population suisse	Pas de recommandation relative à la constitution de stocks. Généraliser l'hygiène des mains et, de manière générale, les mesures comportementales

\* Ces recommandations comprennent, dans tous les domaines, le respect des mesures d'hygiène associées.

\*\* Poste à temps plein